

名稱　黑眶蟾蜍
學名　*Bufo melanosticus*

與盤古蟾蜍相似。是大型兩棲類，
體背顏色爲黃褐色或黑褐色，
眼眶上方至吻端有一帶狀黑脊綠，
體背表佈滿黑色瘤狀突起。
俗稱癩蛤蟆，族群數量非常多，
在空曠地方都能見到牠們的蹤影。



名稱　翡翠樹蛙
學名　*Rhocophorus prasonatus*

台灣特有種，目前列爲保育類動物之一。
體型屬中型修長型，雄蛙5～6公分，雌蛙6～8公分。
眼球瞳孔外側的虹膜爲金黃色。
前肢上臂前緣爲黃褐色，
白線下方綴有一些大黑斑。體表較粗躁。
僅分佈於台灣北部低海拔山區的樹林中。



名稱　褐樹蛙
學名　*Buergeria robustus*

台灣特有種，與白頷樹蛙相似。
具大型黑褐色粗條紋及斑點。
眼眶間隔具一黑褐橫帶，並向後頭部形成一倒三角形，
花紋前端至吻端爲一淡色部分，此爲主要辨識特徵。
體背爲黃褐色或綠褐色。吸盤相當發達。
主要分佈在低海拔山區的溪流附近，石頭或樹叢中。



名稱　盤古蟾蜍
學名　*Bufo gargarizans*

是台灣特有種，與黑眶蟾蜍相似，
大型兩棲類，體型約在6～11公分左右，
體背顏色爲黃褐色或紅褐色或褐色，
有些具有大型黑斑或橙紅色斑點，
外表佈滿腺性瘤狀突起，
大都分佈於山區及近山附近的丘陵地。



名稱　澤蛙
學名　*Rana limnocharis*

中、小型蛙類，體型約有4～6公分，
體背爲黃褐色到綠褐色，
夾雜有深褐色斑及長條形皺紋，
無背側褶。腹面淡黃色，胸部有黑色雲斑。
蹼不發達，長度僅及趾長度的一半或稍多。
廣泛分佈於中海拔以下的水田及溪畔，數量極多。

哺乳類



名稱　小黃腹鼠
學名　*Rattus losea*

小黃腹鼠偏好在人類活動的農墾區，
或雜草叢生的荒廢地。
夜間活動爲主，喜食甘蔗、花生、地瓜等農作物，
普遍分布在低海拔地區的農墾地及荒廢草生地，
爲農墾地普遍的野鼠，亦爲田地的優勢鼠種。



名稱　台灣灰鼩鼱
學名　*Crocidura attenuata tanakae*

又稱灰麝鼩。
乍看之下，體型長得很像我們熟知的錢鼠，
只是體型較小。族群數量不少，
但要發現牠們並不容易，因爲體型小，
加上通常在夜間才出來活動覓食的緣故。蟲食性，
以地表土層之昆蟲幼蟲或小型無脊椎動物爲食。

魚類



名稱　台灣石鱝
學名　*Acrossocheilus paradoxus*

俗稱爲石斑或秋斑，爲台灣特有種。
喜歡棲息於水流湍急、較高溶氧的溪流
及較清澈的深潭底層中。
成魚白天常躲藏於石縫之中，夜間才出來覓食，
幼魚則終日在沿岸、石頭間或岩壁上穿梭覓食。
雜食，主要攝食石頭上的藻類及水生昆蟲。